

台湾蠓蠊在贵州省的记载*

吴家荣

(贵阳中医学院)

我国蠓的种类,据胡经甫(1956)以及瞿逢伊(1959)的统计已有106种,再加上陈亢川、蔡连来(1962),姚文炳(1964),俞宗卿(1965)的报告,大约已有112种;但就其已知的分布地区看,仅有东北、华北、内蒙古、台湾,以及四川、福建、广东(包括海南岛)、广西等地。作者十余年来在贵州采集蚊虫和进行药用动、植物的区系调查时,曾采集了一些蠓类标本,兹先就国内分布广泛、嗜吸人血的台湾蠓蠊的一些资料报道如下:

(一)分布:在贵阳(太慈桥、湘雅村、八角岩、尤洞堡),印江(梵净山),石矸(花桥),铜仁(地区招待所),思南(城关乌江边),玉屏(城关,在其邻近的湖南省晃县河边亦发现),锦屏(茅坪),天柱(高壤)等县、市查见。均为贵州省第一次纪录。

(二)习性:成虫在白天上午10时,至下午5时左右,在山区或林区的住宅附近、住宅内、山林

间、山边田土等地叮人,驱之不去。此与国内多数作者的观察大致相似。

(三)垂直分布:大多数发现于海拔1,000米以下地区。作者曾在印江梵净山观察(1963年8月),在张家坝(1,000米)河边尚发现有大量成虫叮人,到陈家坡(1,300米)则已很少见,到护国寺(1,500米)以至山顶(2,500米)则未发现蠓叮人。这可能与风力、相对高度、气温有关。

(四)发现日期:1954年8月(玉屏、晃县),1957年、1958年、1962年6、7、8、9各月(贵阳),1956年8月(锦屏),1963年8月(思南、印江),1968年8月(石矸),1968年9月(天柱),1970年6月(思南、铜仁)。因未能作季节分布调查,上述采集日期可表明多发现于夏、秋两季。

* 罗国隆、江大伦、李雅茹、周志坤、戴维莹等同志参加标本采集。